CONSOLID ®

PAROXETINA 20 mg

Caja por 30 comprimidos Recubiertos.
Venta Bajo Receta Medica

FORMULA:

CONSOLID 20 mg:
Cada comprimido contiene:
Paroxetina ..... 20 mg.
Excipientes ..... c.s.
Vía de Administración: Oral.

Indicaciones terapéuticas:
Síndromes antidepresivos con melancolía. Episodios depresivos mayores o severos. Depresión recurrente. Disrimias. Trastorno obsesivo compulsivo. Usos adicionales: solo o como coadyuvante en el tratamiento de la neuropatía diabética y en el dolor de cabeza tensional crónica. Trastorno de la conducta alimentaria.

Mecanismo de Acción y Datos de Farmacocinética:
PAROXETINA es un agente antidepresivo, que actúa facilitando de forma selectiva la neurotransmisión serotonergica, mediante la inhibición de la recaptación sináptica de serotoninergia. Es un análogo de la fluoxetina. Los metabolitos principales de paroxetina son productos de oxidación y metilación que se eliminan rápidamente y que no es probable que contribuyan a la acción terapéutica dada la práctica ausencia de actividad farmacológica de los mismos. No produce alteración psicomotora ni potencia el efecto depresor del etanol.
Farmacocinética: es bien absorbida en el tracto digestivo, aunque experimente metabolismo de primer paso. Su biodisponibilidad oral es del 50%. Los niveles plasmáticos estables se obtienen al cabo de 7 – 14 días del inicio del tratamiento y la fármacogenética no se modifica durante tratamientos prolongados.
Distribución: se une en un 95% a las proteínas plasmáticas.
Eliminación: más del 95% de la dosis es metabolizada, principalmente en el hígado, dando lugar a metabolitos inactivos. Su vida media de eliminación es de 21 hs. (hasta 36 h. en ancianos y pacientes con insuficiencia hepática grave.

Posología y Modo de Empleo:
La dosis inicial recomendada es de un comprimido de 20 mg por día en una única toma matinal. Puede incrementarse de a 10 mg hasta llegar a 50 mg por día. De acuerdo con la respuesta del paciente. Ancianos: la dosis inicial debería ser de 20 mg/diarios, que pueden aumentarse de a 10 mg hasta un máximo de 40 mg/día, de acuerdo con la respuesta del paciente

Contraindicaciones:
Uso simultaneo con IMAO. Hipersensibilidad al fármaco. Insuficiencia renal severa. Niños. Lactancia. Embarazo.

Reacciones Adversas:
Dolor de cabeza, astenia, dolor abdominal, palpitaciones, vasodilatación. Sudoración, mareos, somnolencia, insomnio, agitación, temblores, ansiedad, náuseas, vómitos, boca seca, alteraciones en la eyaculación.

Precauciones y Advertencias:
No se recomienda el uso en niños, ya que la seguridad y la eficacia del fármaco no se han establecido para este grupo etario. El paciente que recibe paroxetina no debe operar maquinaria pesada ni conducir automóviles. Para cambiar de paroxetina a un IMAO, o viceversa, debe suspenderse la administración de cualquiera de ellos al menos dos semanas antes de iniciar la administración del otro.

Restricciones de Uso:
Uso profesional.

Interacciones:
Administrado con triptófano: dolor de cabeza, náusea, sudoración y mareos. Los pacientes que reciben paroxetina no deberían ingerir alcohol. Con digoxina se ha observado una disminución del área bajo la curva media de esta droga, cuando se coadministra con la Paroxetina. Prociclidina: si se observan efectos anticolinérgicos en la coadministración con paroxetina, la dosis de prociclidina debería ser reducida.

Sobredosis:
Náuseas vómitos, somnolencia. No se han observado casos fatales. El tratamiento debe ser de sostén, asegurando el establecimiento de la ventilación y oxigenación. La diuresis forzada, la diálisis y la hemoperfusión no son beneficiosas en la eliminación de la Paroxetina del organismo. En caso de urgencia recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Hospital de Emergencias Medicas. Tel: 220418 o al 204800(int 011)

Conservación:
Mantener a temperatura ambiente, protegerlo de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentaciones:
Caja x 30 comprimidos recubiertos.
Venta Bajo Receta.
Elaborado por COMFAR S.A.E.C.A.
Av. Artigas 2315 y Sgto. Fernandez-Asunción
Teléf.: (595 21) 292 031/33 Fax: (595 21) 294 576
Director Técnico: Q. F Maria Lourdes Id Reg. Prof. Nº: 2962
Para H-PAR S.A.C.I. 21 de Setiembre y Leonismo Luqueño; Luque
Telef. 595 21 645323
Regente: Q.F. Rosa Nicora Reg. Prof. Nº 1194

PHARMORGANICA
LABORATORIOS